



Fytomenadion

drank

10 mg/ml FNA

Lees deze hele bijsluiter zorgvuldig door, voordat u start met het gebruik van dit product.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Hebt u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit product is aan u persoonlijk voorgeschreven; geef het niet door aan anderen. Dit product kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn, als waarvoor u het product hebt gekregen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat is Fytomenadiondrank FNA?

Vitamine K1 speelt een belangrijke rol bij de bloedstolling.

Fytomenadiondrank FNA wordt gebruikt ter voorkoming en behandeling van bloedingen als gevolg van een vitamine K-tekort (door sommige aandoeningen zoals cystische fibrose, bepaalde darmziekten), verminderde vitamine K-werkzaamheid (door bepaalde geneesmiddelen zoals salicylaten, anti-epileptica, sulfonamiden) of

overdosering van bloedverdünnende geneesmiddelen (coumarinederivaten) en als eenmalige startdosering bij neonaten en borstvoeding.

Wat u moet weten

Gebruik Fytomenadiondrank FNA niet als u overgevoelig bent voor vitamine K1 of één van de andere bestanddelen van dit product.

Fytomenadiondrank FNA kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Vitamine K1 vermindert de werking van sommige bloedverdünnende geneesmiddelen (coumarinederivaten). Gelijktijdig gebruik van vloeibare paraffine kan de opname van vitamine K1 verminderen.

Niet gebruiken zonder overleg met uw arts of trombosedienst.

Gebruik voor aanvulling van vitamine K bij borstgevoede zuigelingen geen Fytomenadiondrank FNA, maar een lager gedoseerd vitamine K-preparaat in druppels.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij gebruik volgens voorschrift kan Fytomenadiondrank FNA, voor zover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van vitamine K1 op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen, maar invloed van dit product hierop is niet te verwachten.

Overige informatie

Allergie-informatie: dit product bevat arachideolie (pindaolie).

Dosering en wijze van gebruik

Gebruik Fytomenadiondrank FNA strikt volgens voorschrift van uw arts of trombosedienst.

Dit product bevat olie; daarom niet oplossen of mengen met water.

Als u meer dan de voorgeschreven dosering hebt ingenomen of als een kind Fytomenadiondrank FNA heeft ingenomen, dient u direct een arts te raadplegen.

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het bijna tijd is om de volgende dosis in te nemen. In het laatste geval moet u de vergeten dosis niet meer innemen maar overgaan op het voorgeschreven doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis in om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Bijwerkingen

Van Fytomenadiondrank FNA zijn, voor zover bekend, geen ernstige of veel voorkomende bijwerkingen gemeld. Als er toch bijwerkingen optreden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bewaren

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking buiten de invloed van licht (niet in de koelkast). Fytomenadiondrank FNA is na openen 3 maanden houdbaar, maar gebruik het in ieder geval niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat vermeld.

Samenstelling en ingrediënten

Fytomenadiondrank FNA bevat 10 mg vitamine K1 (fytomenadion) en 899 mg arachideolie per milliliter.

Verpakking: vouwdoosje, flacon en bijsluiter.

Fytomenadion drank

10 mg/ml FNA

Melden van bijwerkingen

Uw ervaring met dit product is waardevol voor anderen en kan helpen informatie over dit of soortgelijke producten te verbeteren. Meld deze ervaring daarom op www.meldpuntmedicijnen.nl. Meld bijwerkingen op www.lareb.nl of op www.bipharma.com.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer bijgewerkt in mei 2012.

Bipharma B.V.
Postbus 60017 - 1320 AA ALMERE